

# Le questionnaire 7C sur les intentions de vaccination

---

## *Authors*

Mattis Geiger<sup>1</sup>, Franziska Rees<sup>1</sup>, Lau Lilleholt<sup>2</sup>, Ana Paula Santana<sup>2</sup>, Ingo Zettler<sup>2</sup>, Oliver Wilhelm<sup>1</sup>, Cornelia Betsch<sup>3</sup>, Robert Böhm<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ulm University, Germany, <sup>2</sup>University of Copenhagen, Denmark, <sup>3</sup>University of Erfurt, Germany

Translation by Luc Watrin

---

## *Citation*

Geiger, M., Rees, F., Lilleholt, L., Santana, A.P., Zettler, I., Wilhelm, O., Betsch, C., & Böhm, R. (2021). Measuring the 7Cs of vaccination readiness. *European Journal of Psychological Assessment*, 1–9. <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000663>

---

Ce questionnaire a été développé pour évaluer les facteurs qui influencent l'intention de (ne pas) se faire vacciner. Le questionnaire est une extension du questionnaire « 5C antecedents of vaccination scale » (Betsch et al., 2018, 2019) et intègre les résultats des sciences comportementales et sociales sur les décisions de vaccination (par exemple, Betsch et al., 2015 ; Brewer et al., 2017).

Dans sa forme actuelle, le questionnaire vise la vaccination en général, mais il peut être adapté pour aborder des vaccinations spécifiques (par exemple, COVID-19). Cela peut se faire en ajoutant plus d'informations sur la vaccination spécifique dans l'instruction ou en adaptant les questions même (dans ce dernier cas, une validation supplémentaire est recommandée).

Notices explicatives :

- (R) indique les questions pour lesquelles la réponse doit être recodée avant de pouvoir être traitée ultérieurement (par exemple, lors du calcul de la moyenne d'une sous-échelle ou de l'échelle globale).
- Les questions en gras indiquent que ces items doivent être utilisés dans la version courte (7 items).
- Nous recommandons de supprimer les (R)s et la mise en forme gras des items de la version courte lorsque le questionnaire est présenté aux participants.
- Les items sont actuellement classés par composante. Nous recommandons de les présenter aux participants dans un ordre entièrement (pré-)randomisé.
- Nous recommandons d'utiliser une échelle de notation en 7 points allant de "pas du tout d'accord" à "tout à fait d'accord".





